



Arañas

Araña De Rincón

Loxosceles Laeta

► MORFOLOGÍA

Los arácnidos son considerados uno de los animales más antiguos. Tienen glándulas venenosas y con el veneno matan a su presa. El cuerpo de la araña adulta mide entre 0,8 y 1,2 cm de largo, alcanzando con las patas extendidas hasta 4,5 cm. Color pardo, tórax más claro que el abdomen con mancha oscura en forma de violín con la base hacia adelante.

► HÁBITOS

Es muy difícil atraparla, corre velozmente a esconderse o bien puede saltar a 10 cm de altura; es tímida, no agresiva. Posee hábitos nocturnos y se encuentra fácilmente detrás de cuadros, entretechos, rincones oscuros, ropa y artículos de poco uso y movimiento. Sólo ataca cuando se siente amenazada y esto es cuando accidentalmente alguien la comprime.

► CICLO BIOLÓGICO

La hembra en cada reproducción puede poner en promedio 88 huevos. Estos huevos dan origen a pequeñas arañas, las que luego de 9 a 12 mudas llegarán al estado adulto. Demoran alrededor de 315 días las hembras y 406 días los machos en alcanzar la madurez. Viven 3 años aproximadamente.

► DAÑOS

El hombre comparte su espacio con este artrópodo, y dadas las graves consecuencias que tiene su mordedura que puede ser letal, es la importancia que se le da como plaga a controlar. Los signos y síntomas más comunes son: dolor punzante en la zona, aumento de volumen, eritema en las primeras horas y formación de placa livedoide (mancha color violeta, dura, que se torna más oscura con el transcurso de las horas quedando bien delimitada).

▶ CONTROL Y PREVENCIÓN

Control Físico: Aseo profundo especialmente atrás de cuadros, espejos, muebles, etc. Usar aspiradora y guantes. Como prevención no debe entrar a lugares oscuros y poco aseados, si ingresa se recomienda prender la luz y hacer ruido así las arañas escaparán. Sacudir siempre la ropa de cama, toallas, zapatos, ropa de vestir; dejar la cama separada unos centímetros de la muralla y usar pinturas con repelentes.

Control Biológico: El depredador natural de la araña de rincón es la araña tigre. Se reconoce fácilmente por poseer largas patas y delgadas con una franja de color oscuro lo que la hace ver atigrada. Es muy lenta en sus movimientos.

Control Químico: Es posible usar productos en base a Permetrina, Cipermetrina o Lamhacihalotrina con muy buenos resultados. Aunque no es un insecto, su control se logra mediante fumigación con insecticidas (Cyperkill 25 EC, Atonit 5 EC), los que al ser aplicados, le provocan una gran irritación que la obliga a salir de sus escondites.



▶ **Araña del Trigo o Viuda Negra**

Latrodectus sp.

Araña de importancia en el país dada la potencia del veneno e incidencia de su mordedura. De hábitos silvestres, diurnos y más comunes en verano. Color negro con mancha roja en extremo postero-dorsal. Factible de encontrar en campos de trigo, alfalfa, zonas áridas. El 70% de los accidentes se relacionan a faenas agrícolas y afectan a hombres jóvenes. Hay un gran dolor en la zona de la mordida, contracturas musculares, temblores intermitentes, rigidez muscular abdominal y contractura de extremidades.