

FICHA TÉCNICA

BELL PLUS

EFFECTO EN CADENA · CONTROLA NINFAS Y ADULTOS



COMPOSICIÓN	Indoxacarb 0,6% + Piriproxifen 0,5%
REGISTRO ISP	P-966/22
CLASE TOXICOLÓGICA	Clase III OMS, ligeramente peligroso
FORMATOS	Envase de 30 g.

BELL PLUS es un efectivo e innovador cebo cucarachicida, elaborado con una matriz de insumos alimenticios rigurosamente equilibrados para entregar una óptima atracción y palatabilidad en ambientes de sobreoferta alimentaria. **BELL PLUS** ofrece un completo aporte de carbohidratos, proteínas y grasas, capaces de atraer los diferentes estadios ninfales y adultos de *Blatella germanica* (cucaracha alemana) y *Blatta orientalis* (cucaracha oriental).

BELL PLUS está formulado con Indoxacarb y Piriproxifen, en dosis suficiente para permitir el transporte del cebo desde los lugares de consumo hasta los nidos, amplificando el efecto de **BELL PLUS** incluso en poblaciones que no tuvieron contacto directo con el producto.

El Indoxacarb es un ingrediente activo nuevo, perteneciente a la familia de las oxadiazinas. Precursor de metabolitos con efecto insecticida que, al entrar dentro del organismo de la cucaracha, sufre una serie de transformaciones químicas y enzimáticas que lo hacen activo, dirigiéndose al sistema nervioso donde afecta los flujos de los iones de sodio, causando la muerte.

BELL PLUS posee Piriproxifen, un eficaz ingrediente activo que no solo afecta los procesos de la muda de las diferentes fases ninfales. **BELL PLUS** afecta la embriogénesis (se producen huevos sin embrión) al momento de la generación de estos, o bien reduce significativamente la fertilidad de las hembras.

Por el tipo y concentración de los ingredientes activos, **BELL PLUS** actúa en forma retardada, dentro de las 24 a 72 horas posteriores al consumo, lo que favorece el transporte del cebo a refugios y madrigueras que permiten el traspaso del cebo vía trofalaxia. **BELL PLUS** actúa indirectamente además al permanecer los ingredientes activos en las carcasas (exoesqueletos) o en los cadáveres de las cucarachas, favoreciendo la permanencia del efecto insecticida dentro de los refugios y madrigueras de las cucarachas.



BELL PLUS puede ser usado dentro de programas de manejo integrado de cucarachas en conjunto con Bordo 5ME, Cyperkill Max, Cyperkill Plus u otros productos de nuestra línea profesional.

DOSIS

GRADO DE INFESTACIÓN	DOSIS	COMENTARIO
Alta infestación/ Tratamiento de choque	3 a 4 gotas por m ²	Aplique en lugares de refugio de cucarachas como grietas, resumideros, bajo mesones, detrás de refrigeradores, en campanas de extracción.
Baja Infestación / Mantenimiento	1 a 2 gotas por m ²	

Posee una DL50 superior a 5.000 mg/ kilo (Oral ratas)

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES

- Aunque el producto no emite vapores, ni se conoce de efectos adversos ni irritaciones sobre la piel, utilice guantes y mascarilla al momento de la aplicación del producto.
- Mantenga el producto fuera del alcance de personas inexpertas, niños y animales.
- No permita el contacto con alimentos o agua de consumo.
- Evite ingerir el producto.
- Almacene en un lugar seco, fresco y ventilado, fuera del alcance de personas inexpertas y animales
- No coma, fume o beba durante la aplicación.
- Una vez vacío el envase, dispóngalo en forma segura según las la regulación vigente.

FORMULACIÓN

Cada 100 g. de Bell Plus contienen:

Indoxacarb (CAS: 165252-70-0)	0,6% p/p
Piriproxifen (CAS 27519-02-4)	0,5% p/p
Benzoato de Denantonium (CAS 3734-33-6)	0,1% p/p
Coformulantes c.s.p	100 g.